

Huidtest allergie

Informatie over de huidtest
om allergieën te toetsen

Uniezorg
de specialist dichtbij ■

Huidtest allergie.

In deze folder staat informatie over de huidtest allergie. Met dit onderzoek testen wij of je lichaam allergisch reageert op bepaalde stoffen. Dit doen we door kleine druppels met deze stoffen op je huid aan te brengen.

Vorbereiding

- Bij zwangerschap is het niet mogelijk om een allergietest af te nemen.
- Je hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Van tevoren kan je dus gewoon eten en drinken.
- Voorafgaand aan de huidtest is het niet toegestaan om bepaalde medicijnen te nemen. Deze medicijnen vind je in het overzicht hieronder. Als het stoppen met bepaalde medicijnen voor te veel klachten zorgt, kan je het beste tijdens kantooruren contact hierover op nemen met Uniezorg.
- Smeer voorafgaand aan het onderzoek je onderarmen niet in met bodylotion.

Medicatie waarmee je 5 dagen voor de huidtest moet stoppen

Om de allergie goed te kunnen testen, vragen wij je op 5 dagen voor de huidtest te stoppen met het innemen met antihistaminica (middel tegen allergie of andere aandoeningen) en ontstekingsremmers. Achterin deze folder vind je een overzicht met deze middelen.

Het onderzoek

Nadat je je gemeld hebt op het spreekuur, haalt de doktersassistente je op uit de wachtkamer en brengt je naar de onderzoekskamer. Tijdens de test zit je in een stoel. De assistente brengt 9 druppels met verschillende soorten allergeenextract aan op je onderarm. De druppels worden door middel van een klein prikje in contact gebracht met het huidweefsel. Vervolgens dept de assistente het allergeenextract van de huid en beoordeelt of er een allergische reactie is. Deze reactie bestaat bijvoorbeeld uit roodheid en verdikking van de huid. Als dit gebeurt, betekent dit dat je allergisch bent voor die stof.

Na het aanbrengen van de druppels moet je vijftien tot twintig minuten wachten in de wachtkamer. Hierna bekijkt de assistente of er een allergische reactie optreedt. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer dertig minuten. De gegevens van het onderzoek gaan naar je KNO-arts. Die beoordeelt in welke mate de klachten worden beïnvloed door contact met de geteste stof.



Complicaties en nazorg

Meestal treden er na dit onderzoek geen complicaties op. Er is dan ook geen speciale nazorg nodig. De roodheid en zwelling kan wat jeuken. Je moet hier niet aan krabben, want dan blijft het jeuken. Na ongeveer een uur is de jeuk verdwenen. Bij sommige stoffen is de reactie de volgende dag nog zichtbaar.

Een enkele keer treedt - na zes uur - een verlate reactie op in de vorm van een rode zwelling,. Is de zwelling heftig of ervaar je benauwdheid, bel dan direct naar Uniezorg via (024) 2042626. Buiten kantoor tijden bel je naar de spoedeisende hulp van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 365 83 22.

Uitslag

De KNO-arts neemt de uitslag tijdens de eerstvolgende afspraak met je door.

Vragen

Als je na het lezen van de informatie nog vragen hebt, die je graag aan de KNO-arts wil stellen, schrijf deze dan op en neem ze mee naar je afspraak. De KNO-arts beantwoordt ze graag.

Spreekuur Allergie zorg

Uniezorg Nijmegen – De Boog
Dick Boerrigterplein 2
6663 RC Nijmegen

Telefoon: (024) 2042626
E-mail: info@uniezorg.nl
Website: www.uniezorg.nl

Stop 5 dagen voor de huidtest met:

<i>Antihistamine</i>	
<i>Merknaam</i>	<i>Werkzame stof</i>
Aerius	desloratadine
Allerfree	loratadine
Atarax	hydroxyzine
Cinnipirine	cinnarizine
Cinnarizine	cinnarizine
Claritine	loratadine
Cyclizine	cyclizine
Dramamine	dimenhydrinaat
Emesafene	meclozine/pyridoxine
Fenistil	dimetindeen
Hydroxyzine	hydroxyzine
Indical	mehydroline
Kestine	ebastine
Ketotifen	ketotifen
Marzine	cyclizine
Mebhydroline	mehydroline
Mizollen	mizolastine
Navicalm	hydroxyzine
Periactin	cyproheptadine
Phenergan	promethazine
Polaramine	dexchlorfeniramine
Promethazine	promethazine
Reactine	cetirizine
Rupafin	rupatadine
Semprex	acrivastine
Suprimal	meclozine

Tavegil	clemastine
Telfast	fexofenadine
Tinset	oxatomide
Triludan/Triludan forte	terfenadine
Xyzal	levocetirizine
Zaditen	ketotifen
Zyrtec	cetirizine

<i>Ontstekingsremmers</i>	
<i>Merknaam</i>	<i>Werkzame stof</i>
Albicort	triamcinolonacetonide
Celestone	betamethason
Cortison	cortison
Decadron	dexamethason
Depo-Medrol	betamethason
Dexamethason	dexamethason
Di-Adreson	prednisolon
Hydro-Adreson	hydrocortison
Hydrocortison	hydrocortison
Ledercort	triamcinolon
Lederspan	triamcinolonhexacetonide
Methylprednisolon	methylprednisolon
Methylpresol	methylpresol
Oradexon	dexamethason
Prednisolon	prednisolon
Predison	prednison
Solu-Cortef	hydrocortison
Solu-Medrol	methylprednisolon
Triamcinolon	triamcinolon